




## Kedy použiť v kombinovanej liečbe hypertenzie amlodipín a kedy verapamil SR?<sup>1,2</sup>

Srdcová frekvencia a jednoročná mortalita



# Isoptin® SR zaručuje:

- ◆ **pozvoľný a účinný pokles TK<sup>3</sup>**
- ◆ **účinnú kontrolu TK<sup>3</sup>**  
dávkovanie 1x denne
- ◆ **úpravu zvýšenej srdcovej frekvencie<sup>4</sup>**  
kardioprotektivitu

## Skrátená informácia o lieku

**Názov lieku:** Isoptin 40 mg, Isoptin 80 mg, Isoptin ICHS retard, Isoptin SR 240 mg. **Zloženie:** verapamil hydrochlorid 40, resp. 80 mg v 1 filmom obalenej tablete; 120, resp. 240 mg v jednej tablete s predĺženým uvoľňovaním. **Terapeutické indikácie:** ochorenia koronárnych ciev vrátane chronickej stabilnej, nestabilnej a vazospastickej anginy pectoris a anginy pectoris pri stavoch po infarkte myokardu u pacientov bez srdcového zlyhania, keď nie sú indikované betablokátory. Poruchy srdcového rytmu pri paroxyzmálnej supraventrikulárnej tachykardii, pri atriólno flutter/fibrilácii s rýchlym A-V prevodom (okrem WPW syndrómu). Hypertenzia. **Dávkovanie a spôsob podávania:** denná dávka u dospelých pre všetky indikácie je 120-480 mg v 1-4 jednotlivých dávkach, v závislosti od indikácie a liekovej formy. Deti vyššieho predškolského veku do 6 rokov: 80-120 mg rozdelených do 2-3 jednotlivých dávok. Deti od 6 do 14 rokov: 80-360 mg denne, rozdelených do 2-4 dávok. **Kontraindikácie:** precitlivosť na účinnú alebo niektorú z pomocných látok, kardiogénny šok, akútny IM s komplikáciami, II.a III. stupeň A-V blokády a SSS okrem pacientov s kardiolstimulátorom, kongestívne srdcové zlyhanie; flutter/fibrilácia predsení so súčasným WPW syndrómom. **Špeciálne upozornenia:** osobitnú pozornosť vyžaduje podávanie pri I. stupni A-V blokády, hypotenzii, bradykardii, ťažkej poruche funkcie pečene a obličiek; ochoreniach, pri ktorých je postihnutý neuromuskulárny prenos, gravidite a laktácii. Počas liečby sa nemá vykonávať i.v. aplikácia betablokátorov (okrem liečby na JIS). **Liekové a iné interakcie:** prazosin, terazosin, flekainid, chinidín, teofylín, karbamazepín, lítium, imipramín, glybenklamid, klaritromycín, erytromycín, rifampicín, telitromycín, doxorubicin, kolchicín, fenobarbital, buspíron, midazolam, metoprolol, propranolol, digítotoxín, digoxín, cimetidín, cyklosporín, sirolimus, takrolimus, atorvastatín, lovastatín, simvastatín, almotriptan, sulfínpyrazón, ASA, grapefruitový džús, Hypericum perforatum. **Používanie u gravidít a počas laktácie:** liek sa má počas gravidity a laktácie užívať iba v prípade, keď je to nevyhnutne potrebné. **Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje:** môže byť ovplyvnená schopnosť viesť vozidlo, obsluhovať stroje alebo pracovať v nebezpečných podmienkach. **Nežiaduce účinky:** alergické reakcie, bolesť hlavy, závrat, parestézia, tremor, vertigo, A-V blokáda I-III. stupňa, sínusová bradykardia, zastavenie sinoatriálneho uzla, periférny edém, palpácia, tachykardia, srdcové zlyhanie, hypotenzia, sčervenanie, nauzea, vracanie, zápcha, abdominálna bolesť/nevoľnosť, svalová slabosť, impotencia, gynekomastia, galaktorea, únava. **Balenie:** 30 (Isoptin SR 240 mg), 50 tablet. **Držiteľ rozhodnutia o registrácii:** Abbott GmbH & Co. KG, Nemecko. **Dátum poslednej revízie textu:** február 2011. Vydaj lieku je viazaný na lekársky predpis. **Tento text nenahrádza úplnú odbornú informáciu o lieku. Úplná informácia o lieku je dostupná na vyžiadanie.**

**Literatura:** 1. Špinár J. Cor. Vasa 2011;53:397-400. 2. Špinár J. KARDIOL. REV. 2011;13(3):189. 3. Safar M, et al. Act. Méd.Int. - L'Hypertens. 1990;2:3-7. 4. Grossman E, Messeri FH. Am. J. Cardiol. 1997;80:1453-1458.

**Abbott Laboratories Slovakia s. r. o.**

City Business Center II, Karadžičova 10, 821 08 Bratislava 2  
tel.: 02/4445 41 88, fax: 02/4445 44 20, www.abbott.sk